

Infopjece

ØJENKLINIKKEN LYNGLEV

BØRN – ØJENDRYPNING FØR ØJENUNDERSØGELSE

Patientvejledning om Cyclogyl®/Zyklolat® EDO 1 % til barn

Formål

Beskrivelse af øjendråben Cyclogyl®/Zyklolat® EDO 1 %

Patientgruppe

Børn og deres forældre

Begreber og initial øjenundersøgelse

Pupil: det lille sorte hul i regnbuehinden, som ændrer størrelse alt efter hvor meget lys der er rettet mod øjet

Dilatation: betyder, at pupillen er stor og udvidet maksimalt

Akkommodation: er en naturlig mekanisme som linsen i øjet har til at zoome eller tilpasse sig, så øjet kan se skarpt på flere afstande. Denne evne mister alle omkring 45 års alderen, og derfor skal man bruge læsebriller for at se skarpt. Børns øjne zoomer så meget, at det ikke er muligt at lave en almindelig synsprøve. Derfor skal børns akkommodation afslappes med en øjendråbe, så man kan måle deres "nulpunkt" og således afgøre, om de har brug for briller

Cyclogyl/Zyklolat dilaterer pupillerne og afslapper akkommodationen i ca. 24 timer. Den virker optimalt ca. 25 min. efter drypning og herefter foretages udmåling/autorefraktion af vejledende brillebehov ved at barnet kigger ind i et apparat med et lille billede

Øjendrypning og gener

Barnet får dryppet en dråbe cyclogyl/zyklolat i hvert øje, ved at trække det nederste øjenlåg ned, samtidig med at barnet bliver bedt om at kigge op. Spidsen på flasken/pipetten må aldrig ramme øjet

Mørke øjne dryppes to gange, anden gang 10 min. efter første drypning. Det er første drypning de 25 min. skal beregnes fra

Mange børn, og især små børn, får røde kinder og bliver trætte efter de har fået disse øjendråber. Ligeledes er det ikke muligt for barnet det næste døgn at se ting skarpt tæt på, der er øget lysfølsomhed i samme periode, hvorfor kasket eller solbriller med fordel kan anvendes. Nogle får let feber, hurtig puls. Ved alvorligere bivirkninger (som er meget sjældne), kontakt øjenklinikken, egen læge eller 1813

Referencer: www.medicin.dk

Maj 2018